

KVANTRÖV 6

Kap. 10 Vågpacketsrörelse & superposition av stat. tillst.

$$\Psi_n(x,t) = \Psi_n(x) e^{-\frac{i}{\hbar}(E_n t)}$$

S.E. linjär \Rightarrow linjär superposition av lösningar till S.E.
är också lös.

$$\Psi(x,0) = C_1 \Psi_1(x) + C_2 \Psi_2(x) + \dots + C_n \Psi_n(x) = \sum_{i=1}^n C_i \Psi_i(x)$$


$$\Psi \text{ norm.} \Rightarrow 1 = \int dV \Psi^*(x,0) \Psi(x,0) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C_i^* C_j \int dV \Psi_i^*(x) \Psi_j(x)$$

$$= \left\{ \int dV \Psi_i^* \Psi_j = \delta_{ij} \right\} = \sum_{i=1}^n C_i^* C_i \underbrace{\int dV |\Psi_i(x)|^2}_{=1}$$

$$\text{dvs } \sum_{i=1}^n |C_i|^2 = 1 \Rightarrow \Psi(x,t) = \sum_{i=1}^n C_i \Psi_i(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E_i t}$$

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^n |C_i|^2 E_i$$

$|C_i|^2 =$ sannolikhet att partikeln befinner sig i tillståndet i .



vid viss tidpunkt:

$$\Psi(x) = A \left[1 + 4 \cos\left(\frac{\pi}{a} x\right) \right] \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$$

Vilken möjliga E vid en mätning
och med vilken sannolikhet?

Skriv $\Psi(x)$ som superposition av kända egenfunktioner:

$$\begin{cases} \Psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{2a}\right) & \text{jämma } n \\ \Psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi x}{2a}\right) & \text{udda } n \end{cases}$$

(kända lösningar till
potentialbröppproblem)

... Skriv $\psi(x)$ som linj. komb. av dessa:

$$\begin{aligned} \psi(x) &= A \left[\sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) + 4 \cos\frac{\pi x}{a} \sin\frac{2\pi x}{a} \right] = A \left(\sin\frac{2\pi x}{a} + \underbrace{8 \cos^2\frac{\pi x}{a}}_{=2\cos\frac{\pi x}{a}\sin\frac{\pi x}{a}} \sin\frac{\pi x}{a} \right) \\ &= A \left(\sin\frac{2\pi x}{a} + 8 \sin\frac{\pi x}{a} - 8 \sin^3\frac{\pi x}{a} \right) = \left\{ \sin^3 x = \frac{1}{4}(3\sin x - \sin(3x)) \right\} = \\ &= A \left[\sin\frac{2\pi x}{a} + 8 \sin\frac{\pi x}{a} - 8 \frac{1}{4} \left(3 \sin\frac{\pi x}{a} - \sin\frac{3\pi x}{a} \right) \right] = \\ &= A \left[\sin\frac{4\pi x}{2a} + 2 \sin\frac{2\pi x}{2a} + 2 \sin\frac{6\pi x}{2a} \right] \\ &\quad n=4 \quad n=2 \quad n=6 \quad \leftarrow (n; \psi_n(x)) \end{aligned}$$

Energiegenvärden (fr. kap. 4): $E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m(2a)^2}$

$$\Rightarrow E_4 = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{ma^2}, \quad E_2 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad E_6 = \frac{9\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

Dessa är de möjliga energierna vid mätning!


Sannolikheter $\psi(x) = \sum_{i=1}^n C_i \psi_i(x)$ egenfunkt. m. $E = E_i$
och slk. $|C_i|^2$

Norm.: $1 = \int_{-a}^a |\psi|^2 dx = A^2 \int_{-a}^a \left(\sin^2\frac{2\pi x}{a} + 4 \sin^2\frac{\pi x}{a} + 4 \sin^2\frac{2\pi x}{a} \right) dx = \dots =$
 $= A^2 \cdot 9a \Leftrightarrow A = \frac{1}{3\sqrt{a}}$

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \sum_{i=1}^n C_i \psi_i(x) = \frac{1}{3} \left[2 \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(2\frac{\pi x}{2a}\right) + \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(4\frac{\pi x}{2a}\right) + 2 \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(6\frac{\pi x}{2a}\right) \right] \\ &= \frac{2}{3} \psi_2(x) + \frac{1}{3} \psi_4(x) + \frac{2}{3} \psi_6(x) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow C_2 = \frac{2}{3}, \quad C_4 = \frac{1}{3}, \quad C_6 = \frac{2}{3} \quad \leftarrow \text{sannolikhetserna!}$$

$$\Rightarrow |C_2|^2 = \frac{4}{9}, \quad |C_4|^2 = \frac{1}{9}, \quad |C_6|^2 = \frac{4}{9} \quad \left(\sum_i |C_i|^2 = 1, \text{ OK!} \right)$$



Vid $t=0$: $\psi(x,0) = N \sin^3\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$

Beräkna $\psi(x,t)$!

Skriv $\psi(x,0)$ som linj.komb. av lösningar:

$$\psi(x,0) = N \sin^3\left(\frac{2\pi x}{a}\right) = \frac{N}{4} \left(3 \sin \frac{2\pi x}{a} - \sin \frac{6\pi x}{a} \right) =$$

$$= \frac{N}{4} \left(3\sqrt{a} \psi_4(x) - \sqrt{a} \psi_{12}(x) \right)$$

Norm.: $1 = \int_{-a}^a dx \psi^* \psi = \left(\frac{3N\sqrt{a}}{4}\right)^2 \underbrace{\int dx \psi_4^* \psi_4}_{=1} + \left(\frac{-N\sqrt{a}}{4}\right)^2 \underbrace{\int dx \psi_{12}^* \psi_{12}}_{=1} =$

$$= \frac{N^2 a}{16} (9+1) \Leftrightarrow N = \sqrt{\frac{16}{10a}} = \sqrt{\frac{8}{5a}}$$

Känner vägfkn. vid stat. tillst. \Rightarrow tidsberoende gm. att $\times e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m(2a)^2} \Rightarrow E_4 = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{ma^2}, E_{12} = \frac{18\pi^2 \hbar^2}{ma^2}$$

$$\Rightarrow \psi(x,t) = \sqrt{\frac{8}{5a}} \frac{3}{4} \sin \frac{2\pi x}{a} e^{-\frac{i}{\hbar} \frac{2\pi^2 \hbar^2}{ma^2} t} - \sqrt{\frac{8}{5a}} \frac{1}{4} \sin \frac{6\pi x}{a} e^{-\frac{i}{\hbar} \frac{18\pi^2 \hbar^2}{ma^2} t}$$

15) $\omega = \omega_{t < 0} = \sqrt{\frac{k}{m}}, \omega_{t > 0} = \tilde{\omega} = \sqrt{\frac{k}{\beta m}} = \frac{\omega}{\sqrt{\beta}}$

massändring vid $t=0$
(harm. osc.)

Vet: $V(x) = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2, E_n = \hbar\omega \left(\frac{1}{2} + n\right)$

Vägfkn för gr. tillst.: $\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\hbar\pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2}$

Sökt!
Sannolikhet
för gr. tillst
då $t > 0$

$t < 0$ Grundtillstånd: $\psi(x,t) = \psi_0(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E_0 t}$

$t > 0$ $\tilde{\psi}(x,t) = \sum_{i=0}^{\infty} \tilde{C}_i \tilde{\psi}_i(x) e^{-\frac{i}{\hbar} \tilde{E}_i t}$

$$\tilde{\psi}_0(x,t) = \left(\frac{\beta m \tilde{\omega}}{\hbar \pi}\right)^{1/4} e^{-\frac{\beta m \tilde{\omega}}{2\hbar} x^2}$$

Slu. för gr. tillst. vid $t > 0$ är $|\tilde{C}_0|^2$

$\psi(x,t)$ kontinuerlig i tiden $\Rightarrow \psi(x,0) = \tilde{\psi}(x,0)$ (skarvning)

$$\Rightarrow \psi_0(x) e^0 = \sum_{i=0}^{\infty} \tilde{C}_i \tilde{\psi}_i(x) e^0 \quad \text{mult. m. } \tilde{\psi}_0^* \text{ och integrera}$$

$$\Rightarrow \int \tilde{\psi}_0^* \psi_0 dx = \int \tilde{\psi}_0^* \sum_{i=0}^{\infty} \tilde{C}_i \tilde{\psi}_i dx \Leftrightarrow \int \tilde{\psi}_0^* \psi_0 dx = \sum_i \tilde{C}_i \underbrace{\int \tilde{\psi}_0^* \tilde{\psi}_i dx}_{=\delta_{0i}} = \tilde{C}_0$$

$$\Rightarrow |\tilde{C}_0|^2 = \left| \int \tilde{\psi}_0^* \psi dx \right|^2 = \left| \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\beta m \tilde{\omega} m \omega}{t^2 \pi^2} \right)^{1/4} e^{-\frac{\beta m \tilde{\omega}}{2t} x^2 - \frac{m \omega}{2t} x^2} dx \right|^2 =$$

$$= \dots = \frac{2 \beta^{1/4}}{(1 + \beta^{1/2})}$$

Σ20

Ehrenfest: $\frac{d}{dt} \langle A \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [A, H] \rangle$

Visa virialteoremet: $2\langle T \rangle = \langle \mathbf{r} \cdot \nabla V(\mathbf{r}) \rangle$ (gäller för partikel i potentialfält $V(\mathbf{r})$)

$$\langle \mathbf{r} \cdot \mathbf{p} \rangle = \int \psi^*(\mathbf{r},t) \mathbf{r} \cdot \mathbf{p} \psi(\mathbf{r},t) dV = \left\{ \psi(\mathbf{r},t) = \psi_n(\mathbf{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \right\} =$$

$$= \int \psi_n^*(\mathbf{r}) \mathbf{r} \cdot \mathbf{p} \psi_n(\mathbf{r}) \underbrace{e^{+i/\hbar E_n t - i/\hbar E_n t}}_{=1} dV, \quad \text{dvs tidsoberoende}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \langle \mathbf{r} \cdot \mathbf{p} \rangle = 0 \quad \xrightarrow{\text{Ehrenfest}} \langle [\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, \hat{H}] \rangle = 0$$

Kommutatorer: $[\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, p^2] = \mathbf{p} [\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, \mathbf{p}] + [\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, \mathbf{p}] \mathbf{p}$

$$\text{där } [\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, \mathbf{p}] = \mathbf{r} \underbrace{[\mathbf{p}, \mathbf{p}]}_{=0} + \underbrace{[\mathbf{r}, \mathbf{p}]}_{=i\hbar} \mathbf{p} = i\hbar \mathbf{p}$$

$$\Rightarrow [\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, p^2] = \mathbf{p} i\hbar \mathbf{p} + i\hbar \mathbf{p} \mathbf{p} = 2i\hbar \mathbf{p}^2 \quad \left(\text{Σ10: } [\mathbf{p}, f(\mathbf{x})] = -i\hbar \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right)$$

Dessutom: $[\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, V(\mathbf{r})] = \underbrace{[\mathbf{r}, V(\mathbf{r})]}_{=0} + \mathbf{r} \underbrace{[\mathbf{p}, V(\mathbf{r})]}_{=i\hbar \nabla V(\mathbf{r})} = i\hbar \mathbf{r} \cdot \nabla V(\mathbf{r})$

$$\Rightarrow 0 = \frac{d}{dt} \langle \mathbf{r} \cdot \mathbf{p} \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}, \underbrace{\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{r})}_{\hat{H}}] \rangle = \frac{1}{i\hbar} \left(\frac{1}{2m} 2i\hbar \mathbf{p}^2 - i\hbar \mathbf{r} \cdot \nabla V(\mathbf{r}) \right)$$

$$= \left\langle \frac{\mathbf{p}^2}{m} - \mathbf{r} \cdot \nabla V(\mathbf{r}) \right\rangle = \int \psi^* \left(\frac{\mathbf{p}^2}{m} - \mathbf{r} \cdot \nabla V(\mathbf{r}) \right) \psi dV$$

$$\Leftrightarrow \int \psi^* \frac{\mathbf{p}^2}{m} \psi dV - \int \psi^* \mathbf{r} \cdot \nabla V(\mathbf{r}) \psi dV = 0 \Leftrightarrow 2 \left\langle \frac{\mathbf{p}^2}{2m} \right\rangle = \langle \mathbf{r} \cdot \nabla V(\mathbf{r}) \rangle$$

VSV!

Σ21

a) Harm. osc. i stat. tillst. $\Rightarrow \langle T \rangle = \langle V \rangle = \frac{1}{2} E$ ← ska visat

Harm. osc. $V(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} k r^2 \Rightarrow \nabla V(\mathbf{r}) = k \mathbf{r}$

Vir. teorem $\Rightarrow \langle T \rangle = \frac{1}{2} \langle \mathbf{r} \cdot \nabla V(\mathbf{r}) \rangle = \frac{1}{2} \langle k \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} \rangle = \langle V \rangle$ } $\langle T \rangle = \langle V \rangle$

$$E = \langle E \rangle = \langle T + V \rangle = \langle T \rangle + \langle V \rangle = 2 \langle T \rangle = 2 \langle V \rangle = \frac{1}{2} E$$

OK!

b) Väteatom i stat. tillst. :-

$$V(\mathbf{r}) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow \nabla V(\mathbf{r}) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}} \leftarrow \text{enhetsvektor i } \mathbf{r}\text{-riktning...}$$

Vir. teorem $\Rightarrow \langle T \rangle = \frac{1}{2} \langle \mathbf{r} \cdot \nabla V(\mathbf{r}) \rangle = \frac{1}{2} \langle \underbrace{\frac{r e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}}_{-V(\mathbf{r})} \rangle = -\frac{1}{2} \langle V(\mathbf{r}) \rangle$

$$E = \langle T \rangle + \langle V \rangle = -\frac{1}{2} \langle V \rangle + \langle V \rangle = \frac{1}{2} \langle V \rangle \Rightarrow \langle T \rangle = -\frac{1}{2} \langle V \rangle = -E \text{ OK!}$$

~~Σ21~~ Kap. 11. approximativa metoder


• Variationsmetoden används för att finna gr. tillst.

$$\psi(x, \alpha, \beta, \dots), \text{ minimera } \langle \hat{H} \rangle \text{ w.r.t. } \alpha, \beta, \dots \Rightarrow E_0 \leq \min_{\alpha, \beta, \dots} \langle \hat{H} \rangle$$

• Störningsräkning - för problem "lika" exakt lösbara system

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \Omega K \text{ liten störning}$$

↑
(till (harm. osc., partikel i låda etc...))



a) Uppskatta g.c. tillst. för H-atomen under var.-me

$$\psi = N e^{-\alpha r^2}$$

Strategi:

- ① Normering
- ② Bestäm $\hat{H}\psi$
- ③ Bestäm $\langle \hat{H} \rangle = \int dV \psi^* \hat{H} \psi$
- ④ Minimera $\langle \hat{H} \rangle$ w.r.t. α
 $\Rightarrow E_0 \leq \min_{\alpha} \langle \hat{H} \rangle$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad 1 &= \int dV \psi^* \psi = N^2 \int_0^{\infty} 4\pi r^2 dr e^{-2\alpha r^3} = \\ &= 4\pi N^2 \frac{1}{2^2(2\alpha)} \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}} \Leftrightarrow N^2 = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{3/2} \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}; \quad \nabla^2 \psi = \left[\left(\frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta}) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) \right) \right] \psi$$

ger 0, $\psi \neq \psi(\theta, \phi)$

$$= (4\alpha^2 r^2 - 6\alpha) \psi$$

$$\Rightarrow \hat{H}\psi = - \left[\frac{\hbar^2}{2m} (4\alpha^2 r^2 - 6\alpha) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \psi$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad \langle \hat{H} \rangle &= -4\pi N^2 \int_0^{\infty} r^2 dr \left[\frac{\hbar^2}{2m} (4\alpha^2 r^2 - 6\alpha) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] e^{-2\alpha r^2} = \dots = \\ &= \frac{3\hbar^2 \alpha}{2m} - \frac{e^2}{2\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{2\alpha}{\pi}} \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \quad 0 = \frac{d\langle \hat{H} \rangle}{d\alpha} = \frac{3\hbar^2}{2m} - \frac{e^2}{(2\pi)^{3/2} \epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \Rightarrow \alpha_{\min} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{m e^2}{3\hbar^2 \pi \epsilon_0} \right)^2$$

(koll: $\frac{d^2\langle \hat{H} \rangle}{d\alpha^2} = \frac{1}{\alpha^{3/2}} > 0$
 \Rightarrow minipkt!)

$$\Rightarrow E_0 \leq \min_{\alpha} \langle \hat{H} \rangle = -\frac{m e^4}{12\hbar^2 \pi^2 \epsilon_0^2} = -11,5 \text{ eV}$$

$$(\alpha_{\text{ex}}, \text{ty } E_0 = -13,6 \text{ eV})$$

2) $V(r) = \frac{1}{2}kr^2 \Rightarrow$ harm. osc. (3dim)

Ausatz: $\psi(r) = Ae^{-\alpha r}$, $H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \frac{1}{2}kr^2$

① $1 = \int d^3r \psi^* \psi = |A|^2 \int d^3r e^{-2\alpha r} = 4\pi |A|^2 \int_0^\infty dr r^2 e^{-2\alpha r} =$
 $= 4\pi |A|^2 \frac{2}{(2\alpha)^3} = \frac{A^2 \pi}{\alpha^3} \Leftrightarrow A^2 = \frac{\alpha^3}{\pi}$

② $\nabla^2 \psi = \left[\frac{1}{r} \frac{\partial^2 r}{\partial r^2} r + \frac{1}{r^2} \left(\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta}) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) \right] \psi(r) =$
 $= \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r\psi(r)) = \frac{A}{r} \frac{\partial}{\partial r} (e^{-\alpha r} - \alpha r e^{-\alpha r}) = \frac{A}{r} (-2\alpha e^{-\alpha r} + \alpha^2 r e^{-\alpha r})$

$\Rightarrow \hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{A}{r} (-2\alpha e^{-\alpha r} + \alpha^2 r e^{-\alpha r}) + \frac{1}{2}kr^2 A e^{-\alpha r}$

③ $\langle \hat{H} \rangle = \int dV \psi^* \hat{H} \psi = A^2 \int d^3r e^{-\alpha r} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r} (-2\alpha e^{-\alpha r} + \alpha^2 r e^{-\alpha r}) + \frac{1}{2}kr^2 e^{-\alpha r} \right) =$
 $= A^2 4\pi \int dr r^2 e^{-2\alpha r} \left(\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r} (2\alpha - \alpha^2 r) + \frac{1}{2}kr^2 \right) =$
 $= A^2 4\pi \int dr e^{-2\alpha r} \left(\frac{\hbar^2}{m} \alpha r - \frac{\hbar^2}{2m} \alpha^2 r^2 + \frac{1}{2}kr^4 \right) = \{ \text{Beta} \alpha \} =$
 $= A^2 \left(\frac{\hbar^2 \pi}{2m\alpha} + \frac{4! k \pi}{16\alpha^5} \right) = \frac{\alpha^2 \hbar^2}{2m} + \frac{3k}{2\alpha^2}$

④ $0 = \frac{d\langle \hat{H} \rangle}{d\alpha} = \frac{\alpha \hbar^2}{m} - \frac{3k}{\alpha^3} \Rightarrow \alpha_{\min} = \left(\frac{3km}{\hbar^2} \right)^{1/4}$

$\Rightarrow \langle \hat{H} \rangle (\alpha_{\min}) = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3km}{\hbar^2} \right)^{1/2} + \frac{3k}{2} \left(\frac{\hbar^2}{3km} \right)^{1/2} = \sqrt{3} \sqrt{\frac{k}{m}} \hbar = \sqrt{3} \hbar \omega \geq E_0$


Alljämföra med $E_0 = \frac{3}{2} \hbar \omega$: $\frac{\langle \hat{H} \rangle_{\min}}{E_0} = \frac{\sqrt{3}}{3/2} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1,15$

(dvs 15% för stor uppskattning)

⊗ 5

Störningsräkning!

Partikel rör sig längs x-axeln:



$$V_1 \ll E_0$$

Bestäm E och störningsvärdet.

$$\begin{aligned}
 H\psi &= E\psi, \quad \hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{V}_1 = \\
 &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V^{(0)}(x) + V_1(x)
 \end{aligned}$$

\uparrow "partikel i ledare" - \hat{Q}
 \uparrow pot.

$$(V_1=0)$$

Ostörda problemet har egenfunktioner $\psi_n^{(0)}(x) = \frac{1}{\sqrt{2a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{4a}\right)$

$$\text{och } E_n^{(0)} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{(4a)^2 2m}$$

(ledarens kant vid $x=0$
 \Rightarrow endast sin-funktioner...)

1:a ordn. störningsvärdet: $E_n = E_n^{(0)} + \langle n | V_1 | n \rangle$, där

$$\begin{aligned}
 \langle n | V_1 | n \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^{(0)*} V_1(x) \psi_n^{(0)} dx = V_1 \int_a^{3a} \frac{1}{2a} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{4a}\right) dx = \dots = \\
 &= \frac{V_1}{2} + \frac{V_1}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{32ma^2} + \frac{V_1}{2} + \frac{V_1}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$